

# Je délka vaší inkubace správná?

## Posouzení správné doby vybírání



Maximálně 3 kuřata (nebo 1 – 2 %) vylíhnutá 30 hodin před vybíráním

Pokud je vylíhnuto více jak 1 – 2 % doba inkubace je příliš dlouhá a příští násada by měla být opožděna

## Seznam bodů ke kontrole

Co kontrolovat	Akce	Výsledek pokud je čas vybírání správný
Dolíhně 30 hodin před předpokládaným vybíráním	Spočítejte vylíhnutá kuřata	Maximálně 3 kuřata na lísce
Kuřata při vybírání	Zkontrolujte vlhkost peří vzadu na krku	5 % kuřat může být vzadu na krku mírně vlhkých
Vyvinutá obrysová pera při vybírání	Zkontrolujte rozvinutí péřového praporu	Prapor by neměl být viditelný
Odpady po vybírání	Zkontrolujte znečištění skořápek mekoniem	Skořápky a odpady by měly být relativně čisté

Jakmile se kuře plně vylíhne a oschne, extra čas strávený v dolíhni mu pravděpodobně uškodí

## Vizuální posouzení kuřat při vybírání



Při vybírání by mělo být asi 5 % kuřat stále vlhkých zezadu na krku

## Prázdné skořápky – Co vám říkají

Relativně čisté skořápky znamenají, že doba vybírání je správná

Skořápky znečištěné mekoniem znamenají, že kuřata byla vylíhnutá příliš dlouho



## Přizpůsobte bezpečně dobu inkubace

- Pokud je nesprávná doba inkubace, změňte čas nasazování
- Postupujte v krocích po 3 hodinách (opoždění nasazování může být až o 15 hodin)
- Neustále kontrolujte situaci, abyste určili správný čas pro inkubaci
- Neměňte inkubační teplotu

## Obrysová pera – Co vám řeknou

Pokud začíná být viditelný prapor pera, kuřata byla v dolíhni příliš dlouho

