

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΩΝ

Κρίσιμα σημεία για επιτυχημένη διαχείριση της διατροφής των πατρογονικών.



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΪΣΤΡΑ ΑΝΑ ΠΤΗΝΟ

Θήλυκά Ηλικία (ημέρες)	Αλυσίδα cm (in)	Πιάτο cm (in)
0-35	5 (2)	4 (2)
36-70	10 (4)	8 (3)
71-αποπλυθισμός	15 (6)	10 (4)

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ



i Το ύψος της ταϊστρας πρέπει να βοηθάει σε ομοιόμορφους χρόνους ολοκλήρωσης του ταΐσματος σε όλο τον πληθυσμό



Σωστό
ύψος αλυσίδας



Σωστό
ύψος πιάτου

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

i Αφήστε περίπου 1 m (3,3 ft) μεταξύ των γραμμών τροφοδοσίας. Διανείμετε τον πρώτο γύρο τροφής υπό σκοτάδι.



Σωστό



Λανθασμένο

Χρόνος ολοκλήρωσης του ταΐσματος στο μέγιστο της παραγωγής (ώρες)	Μορφή τροφής
3-4	ΧΟΝΔΡΟ ΑΛΕΥΡΟ
2-3	CRUMBLE
1-2	PELLET

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τους χρόνους ολοκλήρωσης του ταΐσματος, όπως:

- Ηλικία
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Ποσότητα τροφής
- Φυσική ποιότητα τροφής
- Πυκνότητα θρεπτικών συστατικών της τροφής

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ



Αυτόματα πιάτα



Κρεμαστές χοάνες



Αναρτημένη αλυσίδα

Παρακολουθήστε τη συμπεριφορά διατροφής των αρσενικών για:

Τα αρσενικά τρώνε στη σωστή θέση ταΐσματος

Διαρροή ζωοτροφών

Λείπει ο αποκλειστής για τα αρσενικά

Σωστό ύψος ταϊστρας αρσενικών

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ CROP FILL

Αξιολογήστε την διανομή της τροφής παρακολουθώντας το crop fill για να αποφύγετε την απώλεια ομοιομορφίας:

Παρατηρήστε τη συμπεριφορά των πτηνών 30 λεπτά μετά τον πρώτο γύρο τροφής.




Σωστό

Λάθος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ HOPPER

Πώς να διασφαλίσετε ότι ο τελευταίος γύρος τροφοδοσίας έχει κυκλοφορήσει σωστά



Σωστό

ΟΚ: Ολοκληρώστε την τελευταία διαδρομή τροφοδοσίας. Παρόμοιο επίπεδο τροφής απομένει κάθε μέρα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ



Broiler Breeder How to 1: Assess Crop Fill (Aviagen)



Broiler Breeder How to 7: Measure Chain Feeder Speed (Aviagen)

