

Controllare i cassettei di schiusa



30 ore prima della schiusa, al massimo 3 pulcini nati per cassetto (1-2%)

Se i pulcini nati sono più dell'1-2%, il tempo d'incubazione è troppo lungo

Controllare i gusci

Gusci relativamente puliti: tempo di incubazione corretto

Gusci sporchi di meconio: I pulcini rimangono troppo tempo nelle schiuse



Cosa controllare

Cosa controllare	Cosa fare	Cosa ottenere
Cassetti di schiusa 30 ore prima della schiusa	Contare i pulcini nati	Al massimo 3 pulcini per cassetto
Pulcini all'uscita della schiusa	Controllare l'umidità sulla nuca	Il 5% deve essere leggermente umido sulla nuca
Sviluppo della piuma all'uscita della schiusa	Controllare le piume dell'ala	Il ventaglio non deve essere visibile
Gusci rimasti nei cassettei	Controllare il livello di imbrattamento	I gusci devono essere relativamente puliti

Lo stoccaggio in incubatoio, una volta che i pulcini sono tutti nati e asciutti, può solo peggiorarne la qualità

Modificare in sicurezza i tempi di incubazione

- Quando i tempi sono sbagliati, spostare l'inizio dell'incubazione
- Fare passi di 3 ore (potrebbe essere necessario ritardare l'incubazione fino a 15 ore)
- Continuare a verificare la correttezza del tempo d'incubazione
- Non modificare le temperature d'incubazione

Controllare i pulcini all'uscita dalle schiuse



Alla schiusa, il 5% dei pulcini deve ancora avere la nuca umida

Controllare le piume delle ali

Se lo sviluppo delle piume è visibile, allora i pulcini sono rimasti nelle schiuse troppo a lungo

